



Behandlung von Krätze/ Scabies: Parasitäre Erkrankungen

1. Erwachsene (ab 14 Jahren, ausser schwangere Frauen)

Anwendung von Permethrin auf den ganzen Körper, abends nach dem Duschen, ausser auf den Kopf. Speziell zu behandeln sind die folgenden Stellen:

❖ Zehen und Finger Zwischenräume	❖ Handgelenke
❖ Ellbogen	❖ Bauchnabel
❖ Gesässfalten	❖ Achselhöhlen
❖ Brustwarzenregion bei den Frauen	❖ Genitalregion bei den Männern
❖ Fussgelenkregion	

Vorgehen:

- ❖ Belassen Sie das Produkt auf den behandelten Stellen für 12 Stunden und wiederholen Sie die Anwendung nach einer Dusche mit lauwarmen Wasser während 2 aufeinander folgenden Abenden.
- ❖ Nach dem Duschen, ziehen Sie saubere Unterwäsche an und wechseln die Bettwäsche.
- ❖ Nach dem Händewaschen während der Behandlung, applizieren Sie erneut Permethrin auf die gewaschenen Stellen.

2. Kinder über 5 Jahre

- ❖ Anwendung von Permethrin zwischen 6 bis 12 Stunden. Unter Umständen wiederholen.

Achtung: Keine Anwendung von Permethrin auf Schleimhäute, Lippen, Mund oder Augen

3. Schwangere Frauen, Babys und Kinder unter 5 Jahren

- ❖ Anwendung von Permethrin auf den ganzen Körper ausser den Kopf.
- ❖ Belassen Sie das Produkt während 12 Stunden auf dem Körper. Ziehen Sie nach dem Duschen frische Kleider an und wechseln Sie die Bettwäsche.
- ❖ Erneute Applikation auf das Gesäss der Babys nach dem Windelwechseln und nach jedem Händewaschen.

Zusätzliche Massnahmen:

- ❖ Gleichzeitige Behandlung von allen Leuten, die im gleichen Haushalt wohnen.
- ❖ Keine sexuelle Beziehung während der Behandlung mit jemandem, der nicht behandelt wird.
- ❖ Nicht das gleiche Bett benützen wie eine andere Person, die nicht behandelt wird.
- ❖ Wechseln von Unterwäsche, Socken und Bettwäsche nach der letzten Dusche nach Beendigung der Behandlung und Waschen von allen Sachen bei 60 Grad in der Waschmaschine.
- ❖ Andere schon gereinigte und gewaschene Kleidungsstücke müssen nicht gewaschen werden.
- ❖ Wenn der Patient in einem Bett ohne Bettlaken schläft, muss auch die Matratze und der Überzug desinfiziert werden mit Bio Kill Insektenspray® oder einem anderen Produkt gegen Parasiten.
- ❖ Die Übertragung erfolgt über engen Körperkontakt; Bettwäsche und Unterwäsche.